

Besinlerin fermentasyonu



© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com




Search ID: cza0051

*"I HAVE A BETTER IDEA! LET'S SQUEEZE THE APPLE
AND FERMENT THE JUICE!"*

Fermentasyon

Piruvat dönüştürülür:


- Etanol
- Laktik asit
- Asetik asit



Fermentasyon

Piruvat dönüştürülür:

- Etanol



- Laktik asit



- Asetik asit



Fermente besin ürünleri

- Şarap
- Bira
- Süt ürünleri: Yoğurt, peynir...
- Sebzeler
- Et ve kümes hayvanları
- Balık ve deniz ürünleri
- Geleneksel ürünler
- Kakao ve kahve

Şarap



Meyve suları
Özellikle üzüm
(şeker oranı yüksek)



Şarap
Tatlı şarap
Köpüklü şarap

Meyve yüzeyindeki mayalar: *Kloeckera*, *Hanseniaspora*...
Saccharomyces cerevisiae, *S. ellipsoideus*...

Doğal fermentasyon


Uyarılmış fermentasyon

Malolaktik fermentasyon:

Alkolik fermentasyondan 2-3 hf sonra başlar, 2-4 hf sürer.

Şaraptaki laktik asit bakterileri veya eklenen *Leuconostoc oenos*.

L-malik asit dekarboksilasyonla L-laktik aside dönüşür.



Şarap

Kırmızı

Ezme, sülfür dioksit eklenmesi

- Meyve suyu ve kabukları
- *Maya ile inkübasyon
- Yumuşatma ve kısmi fermentasyon
- Pres
- Fermentasyonun tamamlanması ve tortunun uzaklaştırılması

*Malolaktik fermentasyon

Yıllandırma

İnceltme ve saydamlaştırma

Beyaz

• Ezme, sülfür dioksit eklenmesi

- Fermentasyon öncesi işlemler
- Pres: Kabuklar ayrılır.
- Meyve suyu
- *Maya ile inkübasyon
- Fermentasyon
- Maya tortusunun uzaklaştırılması



Köpüklü Şarap

- Şaraba son derişim 2,4 mg/mL olacak şekilde şeker eklenir.
- Uygun bir *S.cerevisiae* suşu eklenir.
- Karıştırılır ve şişelenir. Şişeler yüksek basınca dayanacak şekilde kapatılır.
- 12-15°C'de 3-6 ay içinde fermentasyon tamamlanır.
- Maya tortusu özel yöntemlerle alınır.





Şarap




Sokak suşları ~%4 etanole dayanıklıdır.

- Üretimde kullanılan mayalar %14 etanole dayanırlar ancak %10'a ulaştıktan sonra fermentasyon yavaşlar.
- Fermentasyon sırasında ısı açığa çıktığından sıcaklık kontrol altında tutulmalıdır.
 - Kırmızı şarap 20-30°C'de 7 gün
 - Beyaz şarap 10-18°C'de 7-14 gün
- Toksin üreterek istenen mayayı öldüren mayalar (Bazı *S.cerevisiae*, *Candida*, *Pichia*, *Hanseniaspora*, *Hansenula*... suşları) sorun olabilir.
- *Bacillus*, *Clostridium* gibi sporlu bakteriler üreyerek bozulmaya neden olabilirler.
- Özellikle bozuk üzümlerdeki küfler şarap oluşumunu olumsuz etkilerler. Anaerob ortam ve sülfür dioksit küf yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Sirke



- Saf etanol
- Üzüm suyu, şarap
- Elma suyu (şeker oranı yüksek)



- Distile sirke (Asetik asit)
- Üzüm sirkesi
- Elma sirkesi

Asetik asit bakterileri


Acetobacter

Gluconobacter

Bira

Malt
(çimlenmiş arpa)
Nişasta →
şeker

Islatma
Çimlendirme
Kurutma



Arpa
mayası


Şerbetçiotu ile
kaynatma



Bira

Saccharomyces cerevisiae
S.cerevisiae, *S.carlsbergensis*...

Yüksek sıcaklıkta koyu
renk → "dark"





Bira




- Mikrobiyal kontaminasyon önemli bir risk.
 - Küfler daha çok depolanma sırasında kontamine eder (Aspergillus, Penicillium, Fusarium...). Mikotoksin oluşabilir.
 - Mayalar (Brettanomyces, Candida, Debaryomyces, Pichia...) asetik asit oluşumu ve bulanıklığa neden olabilirler.
 - Laktik asit bakterileri (Lactococcus, Pediococcus) diasetil oluşumu ve bulanıklığa neden olabilirler.

Alkol oranı daha yüksek içkiler

- Fermentasyon ile elde edilen etanol özel yöntemlerle yoğunlaştırılır.
 - Rakı
 - Viski
 - Votka
- Fermentasyonla elde edilen içkilere etanol eklenir.
 - Kuvvetlendirilmiş şaraplar
 - Şeri, brendi...





CORPUS CALLOSUM

The bridge joining the two halves of the brain, called the corpus callosum, is larger in Marge than in Homer. Marge can integrate information from the two halves of the brain, meaning that she can simultaneously make Homer's lunch, listen to Lisa's saxophone playing and insure that Bart doesn't burn anything, while Homer has trouble combining singing and driving without crashing into a chestnut tree.

HEART AND CIRCULATORY SYSTEM

While Marge is young, Bart's shenanigans are less likely to give her high-blood pressure than Homer's. Her higher levels of estrogen prevent cholesterol deposits from forming on artery walls. By the time Lisa graduates from Yale, however, Marge's risk for heart disease will begin to match his.

LYMPHATIC SYSTEM

If Marge gets a cold, her immune system will respond more forcefully than Homer's immune system. But she is also more likely to suffer from diseases, like rheumatoid arthritis and lupus erythematosus, linked to a highly active immune system that overfunctions.

LIVER

Homer metabolizes beer faster and more efficiently than Marge does, so he is less likely to get a hangover. But that immunity may partly explain why more men are alcoholics.

STOMACH

No one can dispute that Homer is the gourmand of the Simpsons. He is unable to resist pork chops, chocolate and Vaseline. But in the unlikely event that he decided to lose weight, he could diet. For Marge, however, losing weight would require not only giving up Jello desserts, but exercising.

SKELETAL SYSTEM

Homer's body will always produce testosterone, but estrogen production virtually halts when a woman goes through menopause. Because these hormones rejuvenate bones, this means that while Homer will always survive cliff falls on Bart's skateboard unscathed, Marge's bones could become more brittle.

ART GRAMING

Fermente st rnleri

- Peynir
- Yoęurt
- Kefir
- Kimiz...




Fermente st rnleri



- Bařlangıř kltr
- zel olarak eklenen ikincil kltrler
- Aroma veren bileřiklerin oluřumu (diasetil, aetaldehit...), peynirde gzenek (CO_2)...
- Proteolitik sistemler
- ...
- St rnleri nemli: Laktokoklar genetik yapısı ilk incelenmeye bařlanan bakterilerden.

Fermente st rnleri

St




Yoęurt

Lactobacillus delbrueckii subsp. *bulgaricus*
Streptococcus thermophilus



Fermente st rnleri

St



Peynir

**Lactococcus lactis* subsp. *cremoris*

**Lactococcus lactis* subsp. *lactis*

Streptococcus thermophilus

Lactobacillus delbrueckii subsp. *bulgaricus*

Lactobacillus helveticus...

kincil kltrler:

Leuconostoc, *Penicillium*

Sitrat + *Lc.lactis* subsp.*lactis*

Geotrichum candidum...



Fermente st rnleri



- Sorun:
 - Stteki antibiyotikler
 - Bařlangıç kltrnn ařırı olgunlařmıř olması
 - Heterofermentatif bakterilerle kontaminasyon
 - Bakteriyofajlar nedeniyle eklenen bakterilerin lm
 - Konjugasyonla fajlara direnç aktarılır.
 - Adsorpsiyon nlenebilir.
 - Restriksiyon-modifikasyon sistemleri bakteri iine giren faj DNA'sını tanıyarak paralayabilir.
 - Abi sistemleri faj replikasyonunu ve salınan faj sayısını azaltabilir.

Fermente sebzeler



- Gıdanın korunması ve raf ömrünün uzaması
- Özgün tat, koku ve dokunun gelişmesi
- Doğal toksin ve istenmeyen maddelerin (nitrat, nitrit...) azaltılması/yok edilmesi
- Üründe istenen bazı metabolitlerin artması (Laktik asit, aminoasitler...)
- Gıdanın hazminin kolaylaşması //bakla
- Gıdanın biyoyararlanımının artması
 - Barsakta Fe emiliminin kolaylaşması
- Yeni ürünlerin geliştirilmesi
 - Soyadan peynir benzeri tofu yapımı

Fermente sebzeler

- Zeytin
- Kornişon
- Beyaz lahana
- Patlıcan
- Enginar
- Karnabahar
- Biber



- Zeytin
- Turşu
- Sauerkraut
- ...

Laktik asit bakterileri

Leuconostoc mesenteroides

Lactobacillus spp., *Acetobacter aceti*, *Gluconobacter oxydans*

Aspergillus

Saccharomyces cerevisiae



- Yeşil domates
- Yeşil fasulye



Fermente sebzeler



- Fermentasyonu etkileyen etmenler:
 - İşlenen sebze/meyvenin kalitesi
 - İşlenen gıdanın üzerindeki flora
 - İşlemek için kullanılan teknoloji:
 - Soyma, parçalama, bütün işlenecek ürünler için (//bezelye) boyutlara göre ayırma, alkali işlem (zeytin)...
 - Katkı maddeleri
 - Tuz
 - Karbonhidratlar: Fermente olur ve asiditeyi artırırılar.
 - Protein içeriği (asiditeyi tamponlama etkisi)
- Fajlar genellikle sorun olmaz, saf kültür kullanılmıyor.

Fermente et ve kümes hayvanları



- Etin parçalanması
- Tuz, baharat, koruyucu ve başlangıç kültürünün eklenmesi
- Homojenizasyon
- Yarı geçirgen bir kılıfa hava kalmayacak şekilde doldurma
- Olgunlaştırma
- Bazen tütsüleme
- Isıtma ile inokulumun ve patojen bakterilerin yok edilmesi
- Kurutma

Doğal laktik asit bakterileri

Lactobacillus

Lactococcus

Pediococcus

Leuconostoc

Streptococcus

Enterococcus

Vagococcus

- Salam
- Sosis
- Sucuk

-/+ Micrococcus
Staphylococcus

Fermente et ve kumes hayvanlari



- Bařlangıř kltr:
 - Homofermentatif olmalıdır.
 - Tuza dirençli olmalıdır.
- Nitrit iřeriđini azaltmak iřin sodyum askorbat eklenebilir.

Fermente balık ve deniz ürünleri



- Özellikle Uzakdoğu'da çok yaygın.
- Et ve kümes hayvanları fermentasyonu ile benzer.
- //Balık sosu, balık ezmesi...



Geleneksel fermente besinler

Geleneksel fermente besinler

Un



Ekmek

Saccharomyces cerevisiae

Laktik asit bakterileri

Diğer mayalar



Geleneksel fermente besinler

- Tahıllar
- Yoğurt



- Tarhana

Laktik asit bakterileri



Kakao



- *Theobroma cocoa*
- Fermentasyon: Tat için önemli
- Kurutma



Kakao




- Homofermentatif laktik asit bakterileri
- Asetik asit bakterileri
- mayalar





Kahve



- Escherichia
- Aerobacter
- Bacillus
- Fusarium



Kahve

- Fermentasyonun tada etkisi azdır.
- Çekirdeklerin ayrılmasını sağlar.
- Tada asıl etki eden kavurma işlemi.



Kahve

- *Paradoxurus hermaphroditus*

